

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
REGION ALSACE

Bulletin technique de la Chambre d'agriculture de région Alsace

N° 25 du 9 octobre 2013 – 2 pages

GRANDES CULTURES

FLASH' CULTURES

Colza

Les colzas se sont très bien développés la semaine passée, avec la sortie d'une à deux feuilles.

Charançon du bourgeon terminal : début du vol

Les premières captures de charançons du bourgeon terminal ont été relevées cette semaine sur 9 parcelles (soit 50 % des parcelles du réseau d'épidémiosurveillance alsacien) avec en moyenne 2,2 adultes piégés par cuvette active. Rappel : le charançon du bourgeon terminal est de petite taille (2,5 à 3,7 mm) et il se reconnaît par l'extrémité de ses pattes rousses. Ce ravageur est d'autant plus nuisible sur les colzas chétifs au moment de l'arrivée de l'insecte.

Les prochaines semaines devraient permettre de préciser la dynamique de vol du ravageur et notamment l'identification du pic de vol régional.

COLZA

Charançon du bourgeon terminal

MAIS

Le point sur les humidités


Préconisations

La maîtrise des ravageurs, si elle est nécessaire, doit idéalement intervenir 8 à 10 jours après les premières captures sur la parcelle.

Il est donc encore trop tôt pour intervenir

Tenthredes et autres larves défoliatrices

Sur certaines parcelles, quelques symptômes de défoliation par des larves phytophages sont observés. Proches de dégâts de limaces, ils s'en distinguent par des attaques uniquement sur les limbes, les nervures n'étant pas attaquées. L'observation attentive de la végétation et du sol à proximité des colzas attaqués révèlent la présence de larves de tenthrede (de couleur sombre à noire, et qui s'enroulent dès qu'elles tombent à terre ou lorsqu'on les touche).



Larve de tenthrede

Sur une parcelle du réseau, des larves de piéride de la rave (larve verte) sont observées. Les dégâts occasionnés par ces ravageurs sont mineurs et se limitent à quelques lacérations de feuilles.

Préconisations

La maîtrise de ces ravageurs n'est généralement pas nécessaire.

Rédacteurs : Benoit GASSMANN – Patrice DENIS – Alain WEISSENBERGER

(*) La Chambre d'agriculture de région Alsace est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF 01762 dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Chambre d'agriculture de région Alsace

■ Siège et Site du Bas-Rhin

2 rue de Rome - BP 30022 - SCHILTIGHEIM

67013 STRASBOURG Cédex

■ téléphone : 03 88 19 17 17 ■ fax : 03 88 83 30 54

■ Site du Haut-Rhin

11, rue Jean Mermoz - BP 80038

68127 STE CROIX EN PLAINE

■ téléphone : 03 89 20 97 00 ■ fax : 03 89 20 97 01

■ mail : direction@alsace.chambagri.fr ■ Site internet : www.alsace.chambagri.fr

■ Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

D3 4 50 43386

P43

Maïs

Où en sont les humidités ?

Sur différents sites alsaciens, nous avons mesuré les humidités des grains de maïs à partir d'un égrenage manuel. Pour se rapprocher de l'humidité mesurée suite à une récolte « machine », il faudrait rajouter 2 à 3 points à ces valeurs.

En 2 semaines, les humidités ont très peu baissé, en moyenne de 5,3 %, soit un peu moins de 0,4 % par jour, ce qui est peu. Il faut dire que la météo n'est pas propice à une dessiccation rapide. Sur les variétés cornées (Kohérens...) ces pertes d'eau sont moins importantes. Si les récoltes sont possibles

pour des variétés précoces semées en avril, il faudra encore patienter avec des variétés plus tardives ou des situations en semis tardifs. Dans les situations extrêmes (semis très tardifs dans le Ried ou dans le Sundgau), les maïs sont encore très humides (plus de 50 %). Dans ces situations, il paraît difficile d'espérer une récolte en grain.

Les prévisions météo pour les prochains jours n'augurent pas des températures favorables à la dessiccation des maïs. On considère qu'il faut environ 20 - 22° C en base 6 pour perdre un point d'humidité lorsque les maïs sont entre 40 et 30 % d'humidité. Ces températures se mesurent en moyennant la température maxi du jour avec la température mini et en retranchant 6° C.

| Commune | Variétés | Besoins somme temp base 6-30 Semis- 32% | Date de semis | Humidités au 7 octobre | Humidités au 23 sept | Pertes sur 14 jours |
|-------------------|------------|---|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Woerth | PR38N86 | 1780 | 24-avr | 40.3% | 46.1% | -5.8% |
| | Koherens | 1710 | | 37.6% | 39.5% | -1.9% |
| Truchtersheim | PR38N86 | 1780 | 18-avr | 37.1% | 41.4% | -4.3% |
| | DKC 4590 | 1880 | | 38.7% | 41.7% | -3.0% |
| | DKC4814 | 1930 | | 40.3% | 45.7% | -5.4% |
| Westhouse | Koherens | 1710 | 16-avr | 28.9% | 33.6% | -4.7% |
| | DKC 4590 | 1880 | | 34.5% | 36.9% | -2.4% |
| | DKC4814 | 1930 | | 37.5% | 42.3% | -4.8% |
| | PR38N86 | 1780 | | 30.4% | 33.3% | -2.9% |
| Obenheim | DCK4814 | 1930 | 16-avr | 35.3% | 40.6% | -5.3% |
| | DKC4590 | 1880 | | 33.8% | 37.4% | -3.6% |
| Hilsenheim | KWS 9361 | 1815 | 16-avr | 31.1% | | |
| | ES GALLERY | 1820 | | 30.5% | | |
| | Dkc 4522 | 1890 | | 35.3% | | |
| | PINCKI Cs | 1920 | | 36.3% | | |
| | DEVOLVI Cs | 1920 | | 35.5% | | |
| | AAPOTHEOZ | 1960 | | 38.6% | | |
| Illhaeusern | DKC 4190 | 1840 | 15-juin | 55.2% | 65.4% | -10.2% |
| Illhaeusern | DKC 4012 | 1840 | 13-juin | 53.8% | 64.9% | -11.1% |
| Dessenheim | P9175 | 1760 | 25-avr | 38.1% | | |
| Niederentzen | Pr 38 N 86 | 1780 | 18-avr | 33.0% | 39.8% | -6.8% |
| | DKC 4590 | 1880 | | 36.1% | 41.1% | -5.0% |
| | DCK 4814 | 1930 | | 38.8% | 44.2% | -5.4% |
| Bollwiller | DKC 4012 | 1840 | 23-avr | 29.8% | 35.8% | -6.0% |
| Battenheim | Pr 38 N 86 | 1780 | 17-avr | 27.5% | 35.9% | -8.4% |
| | DKC 4590 | 1880 | | 31.7% | 37.3% | -5.6% |
| | DKC 4814 | 1930 | | 36.9% | 42.0% | -5.1% |
| Burnhaupt le haut | PR39F58 | 1745 | 10-juin | 43.0% | | |
| Uffheim | PR38N86 | 1780 | 25-avr | 32.0% | | |
| Stetten | Koherens | 1710 | 25-avr | 33.3% | 36.7% | -3.4% |
| | PR38N86 | 1780 | | 37.0% | 42.9% | -5.9% |
| | DKC 4590 | 1880 | | 39.8% | 44.9% | -5.1% |
| | | | | | Moyenne | -5.3% |